

Fonctions Numériques

Fonctions continues sur un intervalle

MPSI 2

1 Fonctions continues

Soit I un intervalle non vide.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I .

On dit que f est continue sur I si pour tout x_0 de I , f est continue en x_0 .

Théorème des valeurs intermédiaires

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Soit I un intervalle.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur I .

Montrer que $f(I)$ est un intervalle.

Ou montrer que $\forall (y, y') \in \mathbb{R}^2, ((y, y') \in f(I)^2 \Rightarrow (\forall y'' \in \mathbb{R}, y < y'' < y' \Rightarrow y'' \in f(I)))$

Soit y et y' deux éléments distincts de $f(I)$.

Alors il existe a et b dans I tels que: $f(a) = y$ et $f(b) = y'$

y et y' sont distincts, donc a et b sont distincts.

On suppose par exemple que $f(a) < f(b)$ et $a < b$

Montrer que $\forall z \in \mathbb{R}, (f(a) < z < f(b)) \Rightarrow (\exists x \in]a, b[, f(x) = z)$

Soit z un réel compris strictement entre $f(a)$ et $f(b)$.

On considère l'ensemble $E = \{x \in [a, b], f(x) < z\}$

Principe de Borne supérieure

Montrer que E admet une borne supérieure:

- E est non vide: $a \in E$
- E est majoré par b

Donc E admet une borne supérieure que l'on notera c

On a: $a \leq c \leq b$

Et $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists x \in E, c - \varepsilon < x \leq c$

Pour tout n de \mathbb{N}^* , on pose $\varepsilon = \frac{1}{n}$, et on pose x_n un réel vérifiant le critère.

On définit donc une suite: $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n \in E$ et $c - \frac{1}{n} < x_n \leq c$

En particulier: $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n \in [a, b]$ et $f(x_n) < z$ et $|x_n - c| < \frac{1}{n}$

Ainsi, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers c .

Donc $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers $f(c)$ d'après la caractérisation séquentielle de la limite.

Or, $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(x_n) < z$

Donc $f(c) \leq z$

On a donc $f(c) \leq z < f(b)$

D'où $c < b$.

Par définition de c : $\forall x \in]c, b[, x \notin E$

$$\Rightarrow \forall x \in]c, b[, f(x) \geq z$$

Par ailleurs, f est continue, donc sa limite à droite en c existe et vaut $f(c)$.

Ainsi, $f(c) \geq z$

Conclusion: $f(c) = z$

Conclusion générale: $\exists c \in]a, b[, f(c) = z$

Ce raisonnement est valable pour tout z entre a et b . On étend le raisonnement à y et y' dans $f(I)$

On conclut que $f(I)$ est un intervalle. \square

Propriété 1.0.1

L'image d'un segment par une application continue est un segment.

Soit I un segment réel non vide.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I .

D'après le TVI, $f(I)$ est un intervalle.

Montrer que $f(I)$ est fermé et borné.

- Montrer que $f(I)$ est borné.

C'est à dire, montrer que $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}, y \in f(I) \Rightarrow |y| \leq M$

HA Supposons que $f(I)$ ne soit pas borné.

Donc $\forall M \in \mathbb{R}^+, \exists y \in \mathbb{R}, y \in I$ et $|y| > M$

Soit x_0 un élément de I .

– On considère $E_1 = \{x \in I, |f(x)| > |f(x_0)| + 1\}$

$f(I)$ n'est pas borné, donc E_1 est non vide.

Notons x_1 un élément de E_1 .

– Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons construits $(x_i)_{i \in [0, n]}$,

Tels que: $\forall i \in [1, n], |f(x_i)| > |f(x_{i-1})| + 1$

Soit $E_{n+1} = \{x \in I, |f(x)| > |f(x_n)| + 1\}$

$f(I)$ n'est pas borné, donc E_{n+1} n'est pas vide.

On note x_{n+1} un élément de cet ensemble.

– Par récurrence, on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

De plus, $\forall n \in \mathbb{N}^*, |f(x_n)| > |f(x_{n-1})| + 1$

Par récurrence, on montre que: $\forall n \in \mathbb{N}, |f(x_n)| > |f(x_0)| + n$

Ainsi, $(|f(x_n)|)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

Par ailleurs, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de I . Donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe $\phi : \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(x_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Notons ϕ une telle suite et l la limite.

– $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in I$, donc $l \in I$

– f est continue en $l \in I$, donc (cara séquentielle de la limite) $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(l)$

– On a aussi ①: $|f(x_n)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |f(l)|$ (car abs est continue en $f(l)$)

– De plus, $(|f(x_{\phi(n)})|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(|f(x_n)|)_{n \in \mathbb{N}}$.

Donc ②: $|f(x_{\phi(n)})| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

On a contradiction entre ① et ②. On en déduit que $\boxed{\text{HA}}$ est fausse.

Conclusion: $f(I)$ est in intervalle borné.

- Montrer que $\exists(c, d) \in \mathbb{R}, f(I) = [c, d]$

On pose $c = \inf(f(I))$ et $d = \sup(f(I))$

Montrer que $c \in I$ et $d \in I$

– Montrons que $d \in I$

Donc Montrons que $\exists x \in I, f(x) = d$

En appliquant le principe de la borne supérieure avec $\varepsilon = \frac{1}{n}$ pour tout n de \mathbb{N}^* , on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'éléments de I telle que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers d .

* (x_n) est une suite de réels bornée, donc d'après le théorème de B-W, il existe une application strictement croissante $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $(x_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ soit convergente.

Notons l sa limite.

De plus, $l \in I$.

* f est continue sur I donc $(f(x_{\phi(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(l)$

* Par ailleurs, $(f(x_{\phi(n)}))$ est une suite extraite de $(f(x_n))$, donc $(f(x_{\phi(n)}))$ converge vers d .

Par unicité de la limite, $d = f(l)$. Or, $l \in I$.

Finalement, $d \in f(I)$

– On procède de même pour montrer que $c \in f(I)$.

Conclusion générale: $\exists(c, d) \in \mathbb{R}^2, f(I) = [c, d]$ □

Propriété 1.0.2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors on a équivalence entre:

- ① f est injective
- ② f est strictement monotone

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

① \Rightarrow ②: Supposons f injective.

Montrer que f est strictement croissante sur I .

Donc montrer que f est croissante sur I . (car f est injective)

Montrer que pour tous $x_1 < x_2 < x_3$ de I , $f(x_2)$ soit compris entre $f(x_1)$ et $f(x_3)$

HA Supposons qu'il existe $x_1 < x_2 < x_3$ de I tels que $f(x_2)$ ne soit pas compris entre $f(x_1)$ et $f(x_3)$.

Alors il existe $y_0 \in \mathbb{R}$, tel que y_0 soit compris strictement entre $f(x_1)$ et $f(x_2)$ et entre $f(x_2)$ et $f(x_3)$

D'après le TVI, $\exists \alpha \in]x_1, x_2[$, $y_0 = f(\alpha)$ et $\exists \beta \in]x_2, x_3[$, $y_0 = f(\beta)$

Les intervalles $]x_1, x_2[$ et $]x_2, x_3[$ sont disjoints, donc $\alpha \neq \beta$.

Cependant, $f(\alpha) = f(\beta)$, ce qui contredit l'injectivité de f .

Donc **HA** est contradictoire.

On conclut que f est monotone sur I

Or, f est injective.

Conclusion générale: f est strictement monotone sur I

② \Rightarrow ①: Facile. □

Corollaire 1.0.1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur I .

Alors $J = f(I)$ est un intervalle et f réalise une bijection de I sur J .

Propriété 1.0.3

Soit f une fonction strictement croissante sur $[a, b]$.

Alors on a équivalence entre:

- ①: f est continue sur $[a, b]$
- ②: f est surjective sur $[f(a), f(b)]$

N.B. Fonctionne aussi avec la stricte décroissance.

On suppose f strictement croissante.

① On suppose f continue sur $[a, b]$

f est surjective sur $f([a, b])$ (par définition de l'image)

• $f([a, b])$ est un segment car f est continue: $\exists(c, d) \in \mathbb{R}^2, f([a, b]) = [c, d]$

• f est strictement croissante: $\forall x \in [a, b], f(a) \leq f(x) \leq f(b)$

Donc $\begin{cases} f(a) \text{ est un minorant de } f([a, b]) \\ f(a) \in f([a, b]) \end{cases}$

Ainsi, $f(a)$ est le plus petit élément de $f([a, b])$

Autrement dit, $f(a) = c$.

• On procède de même pour montrer que $f(b) = d$

Conclusion: $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$

② Supposons f surjective sur $[f(a), f(b)]$

Montrer que f est continue sur $[a, b]$

Soit x_0 un élément de $]a, b[$

Montrer que f est continue en x_0 .

C'est à dire $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists \alpha \in \mathbb{R}^{+*}, \forall x \in [a, b], |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Soit ε un réel positif.

Soient $y_0 = \max(\{f(a), f(x_0) - \varepsilon\})$ et $y_1 = \min(\{f(b), f(x_0) + \varepsilon\})$

On a: $f(a) \leq y_0 < f(x_0) < y_1 \leq f(b)$

y_0 et y_1 sont compris entre $f(a)$ et $f(b)$, et f est surjective sur $[f(a), f(b)]$.

Donc $\exists(x_0', x_1'), f(x_0') = y_0$ et $f(x_1') = y_1$

Posons $\alpha = \min(\{x_0 - x_0', x_1' - x_0\})$

Alors $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\subset [x_0', x_1'] \subset [a, b]$ Et $\forall x \in]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[, f(x_0) - \varepsilon \leq f(x_0') < f(x) < f(x_1') \leq f(x_0) + \varepsilon$

Car f est strictement croissante, et par définition de y_0 et de y_1 .

Finalement, $\forall x \in [a, b], |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Ceci est valable pour tout ε strictement positif, donc f est continue en x_0

Ceci est valable pour tout x_0 de $]a, b[,$ donc f est continue sur $]a, b[$

On adapte la démonstration en a et b .

On conclut que f est continue sur $[a, b]$.

□

Corollaire 1.0.2

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement croissante.

Alors f réalise une bijection de $[a, b]$ sur $f([a, b])$ et son application réciproque est continue sur $f([a, b])$.

Supposons f strictement croissante.

- f est strictement croissante, donc f réalise une bijection de $[a, b]$ sur $J = f([a, b])$.
- f est continue donc J est un segment.
- De plus, f est croissante, donc $J = [f(a), f(b)]$
- $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$

Montrer que f^{-1} est continue sur $[f(a), f(b)]$.

f est strictement croissante sur $[a, b]$, donc f^{-1} l'est sur $[f(a), f(b)]$.

Donc, sachant f^{-1} surjective, f^{-1} est continue sur $[f(a), f(b)]$

□

Corollaire 1.0.3

Soit I un intervalle réel.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ strictement croissante et continue.

Alors: • $f(I)$ est un intervalle

- f réalise une bijection de I sur $f(I)$
- f^{-1} est strictement monotone sur $f(I)$
- f^{-1} est continue sur $f(I)$

2 Fonctions uniformément continues

Définition 2.0.1

Soit I un intervalle réel.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

On dit que f est uniformément continue sur I si:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists \alpha \in \mathbb{R}^{+*}, \forall (x_1, x_2) \in I^2, |x_1 - x_2| < \alpha \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Théorème de Heine

Si f est continue sur le segment $[a, b]$, alors f est uniformément continue sur ce segment